

หากถูกกัดแล้ว ควรปฏิบัติตนอย่างไร ?

- ล้างแผลด้วยน้ำสะอาด**
ฟอกสบู่เบาๆ ให้ถึงก้นแผล และล้างออกให้หมด (ถ้าจำเป็นเวลานาน 15 นาที) การล้างแผล จะช่วยลดปริมาณเชื้อได้ถึง **80%**
- ทายาเบตาดีน และรับมาพบแพทย์**
โดยเร็วที่สุด เพื่อรับการรักษา และฉีดวัคซีนป้องกันโรค
- กักสุนัขเพื่อดูอาการ 10 วัน**
ถ้าตายให้นำซากมาตรวจ แต่ถ้าไม่ตาย แสดงว่าสุนัขตัวนั้นไม่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
- ฉีดวัคซีนต่อให้ครบตามนัด**
และควรเข้ารับวัคซีนให้ตรงตามที่แพทย์นัด

ป้องกันสุนัขกัด ได้อย่างไร ?

หลักกาตา 5 ย. ได้แก่
“อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ อย่ายุ่ง”

- อย่าแหย่**
ให้สุนัขโมโห
- อย่าเหยียบ**
สุนัข หรือทำให้ตกใจ
- อย่าแยก**
สุนัขที่กำลังกัดกัน ด้วยมือเปล่า
- อย่าหยิบ**
ขามอาหาร หรือของที่สุนัขหวง
- อย่ายุ่ง**
กับสุนัขจรจัด หรือสุนัขที่ไม่ทราบประวัติวัคซีน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
อำเภอชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่งเกิดได้ใน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว โค กระบือ สุกร รวมถึงคน เมื่อได้รับเชื้อ หากปล่อยไว้จนเกิดอาการ จะเสียชีวิตทุกราย แต่โรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน



ปัจจุบันยังไม่มียารักษา
โรคพิษสุนัขบ้า



สัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ามีอาการอย่างไร?



สัตว์ที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า อาจแสดงอาการได้ 3 ระยะ ได้แก่

1. ระยะเริ่มแรก



มีอาการและนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม กินข้าว กินน้ำลดลง

2. ระยะตื่นตัว

กระวนกระวาย ตื่นเต้น ไม่อยู่นิ่ง กัดทุกสิ่งไม่เลือก วังโล่กัดคนหรือสัตว์



3. ระยะอัมพาต

ค้างคอง ล้มห้อยสีแดงคล้ำ น้ำลายไหล ทรงตัวไม่ได้ เป็นอัมพาตและตาย ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะติดจากสัตว์ที่มีอาการเหล่านี้



ติดต่อได้ทางไหนบ้าง ?

สามารถติดต่อโรคพิษสุนัขบ้าได้ 2 ทาง คือ

1. ถูกกัดหรือข่วน ทำให้น้ำลายของสัตว์เข้าสู่ร่างกายผ่านทางบาดแผล แม้แผลเพียงเล็กน้อยก็สามารถติดต่อได้



2. ถูกเลียที่บาดแผล รอยถลอกหรือรอยขีดข่วน รวมทั้งริมฝีปากหรือนัยน์ตา



อาการโรคพิษสุนัขบ้าเป็นอย่างไร ?

(ผู้ป่วยจะแสดงอาการ หลังได้รับเชื้อประมาณ 3 สัปดาห์ - 6 เดือน หรืออาจนานถึง 1 ปี)

- อาการเริ่มแรก: ไข้ต่ำ เจ็บคอ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย และคันรุนแรงบริเวณแผลที่ถูกกัด
- อาการทางประสาท: กระสับกระส่าย คลุ้มคลั่ง กระวนกระวาย กลัวแสง กลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง มีอาการหนาวสั่น กลืนลำบากโดยเฉพาะของเหลว
- อาการระยะสุดท้าย: กล้ามเนื้อเกร็ง - กระตุก แขนขาอ่อนแรง หายใจไม่ออก แน่นหน้าอก หมดสติและเสียชีวิตในที่สุด

